


**CRITERES D'INCLUSION DES PATIENTES  
EN HAD OBSTETRIQUE ANTE NATALE**  
Un critère coché = entrée en HAD envisageable

<b>1 critère = entrée en HAD envisageable</b>	Rupture <b>P</b> rématuration des <b>M</b> embranes
	Fissure <b>P</b> rématuration des <b>M</b> embranes
	<b>HTA</b> pré existante à la grossesse
	<b>HTA</b> gravidique
	Restriction de <b>C</b> roissance <b>I</b> ntra <b>U</b> térine
	Atcd de <b>M</b> ort <b>F</b> œtale <b>I</b> n <b>U</b> téro
	<b>M</b> enace d' <b>A</b> ccouchement <b>P</b> rématuration
	Cholestase gravidique
	Placenta praevia
	Lupus
	Syndrome des anti-phospholipides
	Pathologie psychiatrique
<b>Critères plurifactoriels</b>	<b>Thrombophilie génétique associée à :</b>
	* Un atcd notable: HRP, MFIU
	* Une complication en cours (RCIU)
	<b>Diabète en cours d'être équilibré :</b>
	* Objectifs glycémiques non atteints prise en charge en étroite collaboration avec le diabétologue
* Retentissement sur la grossesse :	
Macrosomie, hydramnios	



Un seul numéro pour nous contacter 7j/7 et 24h/24 :  
**06-28-59-77-10**

DV1/PC/PEC/04 Version 2 du 31/10/2014

 **CRITERES D'INCLUSION DES PATIENTES  
EN HAD OBSTETRIQUE POST NATALE**  
Un critère coché = entrée en HAD envisageable

<b>Soins post césarienne</b>	Difficultés de cicatrisation
	Difficultés d'allaitement
<b>Surveillance et soins de plaie périnéale</b>	A risque
	Complicquée
<b>Pathologies : vasculaires, thrombo emboliques, endocriniennes et infectieuses</b>	HTA
	Anémie sévère (Hb entre 7 et 9 g/dl)
	Phlébite ou embolie en cours de traitement
	Infection traitement en cours
	DID mal équilibré
<b>Risque psychosocial</b>	Baby blues en cours
	Antécédents de dépression
	Mère en situation de vulnérabilité
<b>Difficultés à l'allaitement maternel</b>	