



PAC

Porth-à-cath ou Chambres à Cathéter implantables

Guide d'informations à destination des patients

Présentation

Pose

Utilisation

À la maison

Synthèse

À quoi sert un PAC?

À administrer des traitements d'une durée supérieure à 6 mois sans avoir à vous piquer dans les veines.

Exemples de traitements: chimiothérapie, nutrition parentérale.


C'est quoi un PAC?

Un PAC se compose:

+ D'un boîtier (appelé **site** ou **chambre implantable**) situé sous la peau de votre thorax. 1

+ Le boîtier est relié à un **cathéter** situé sous la peau. 2

+ Le cathéter se termine dans une veine qui arrive dans le **cœur**. 3




L'aiguille de HUBER, comment ça marche ?

On utilise une **aiguille de HUBER** pour réaliser les injections et les prélèvements dans le PAC.

Il s'agit d'une aiguille piquée dans le boîtier du PAC, à travers la peau.

Pour éviter la douleur de la piqûre, on peut anesthésier la peau au moyen d'un patch.

Un pansement transparent protège l'**aiguille de HUBER**.



Comment pose-t-on un PAC ?



C'est un chirurgien qui pose le PAC au bloc opératoire sous **anesthésie locale**.
Pas d'anesthésie générale.

La pose peut se dérouler en **ambulatoire**
ou lors d'une **hospitalisation**.



Avant l'intervention :

- + Pas besoin d'être à jeun.
- + Prendre une douche au savon liquide.



Après l'intervention :

- + La cicatrice sera protégée par un pansement.
- + Les fils seront enlevés par un IDE* ou disparaîtront tout seuls.
- + Un carnet de surveillance vous sera remis. Ce carnet mentionne que vous êtes porteur d'un PAC. Il est conseillé de le garder sur vous et de le présenter à tous les professionnels qui interviennent sur votre PAC.

* IDE: Infirmier Diplômé d'État

Quelles sont les complications possibles liées à la pose d'un PAC ?

Retard de cicatrisation

C'est quoi ?

La cicatrice ne se referme pas ou se réouvre.

Que faire ?

- 🚫 **Ne pas toucher**
→ risque d'infection.
- 🚫 **Prévenir le médecin hospitalier qui s'occupe de vous sans tarder, ou aller aux urgences.**

Apparition d'un hématome

C'est quoi ?

Présence de sang autour de la cicatrice.

Que faire ?

- 🚫 **Surveiller :**
Il doit disparaître sous quelques jours.
- 🚫 **Si persistance, contacter le médecin hospitalier qui s'occupe de vous.**

Quelles sont les complications possibles liées à la pose d'un PAC ?

Pneumothorax

C'est quoi ?

Une atteinte du poumon lors du geste chirurgical.

Comment cela se manifeste ?

Apparition de **difficultés à respirer** ou de **douleurs thoraciques violentes** lors de la pose voire 1 ou 2 jours après l'opération.

Que faire ?

Prévenir le médecin hospitalier qui s'occupe de vous sans tarder, ou aller aux urgences.



Comment sont réalisés les soins sur mon PAC?



Par qui ?

Uniquement par du **personnel infirmier formé**.

Où ?


À l'hôpital ou à votre domicile.

L'aiguille de HUBER :

- † Peut rester en place 8 jours.
- † Doit être **enlevée quand on ne s'en sert pas**.

Le pansement qui protège l'aiguille de HUBER doit être changé :

- † Tous les **8 jours**.
- † S'il est **décollé** et qu'il **ne protège plus** l'aiguille de HUBER.
- † Si du **sang s'est accumulé**.



Pansement et aiguille de HUBER

Pour tous les jours

Si une **aiguille de HUBER** est dans le **PAC**, respecter les précautions suivantes :

Ne pas toucher le pansement.

Porter des vêtements amples.

Bains, piscine, hammam, sauna... sont **interdits**.

Ne pas mouiller le pansement :
Protéger le pansement lors des douches.



Lorsque vous n'avez pas d'aiguille HUBER dans le PAC, vous pouvez réaliser vos activités habituelles.

Vous devez simplement veiller à **éviter les chocs au niveau du PAC**.

Exemple :
sport violent

Quelles sont les complications possibles liées au PAC ?

Les complications peuvent conduire votre médecin à **retirer le PAC** ou à vous faire **hospitaliser pour des soins** (exemple : antibiotiques).

L'obstruction du PAC

Quels sont les signes qui doivent alerter ?

- 📞 Apparition de **douleurs** lors d'une **perfusion**.

Que faire ?

- 📞 Signaler les signes à l'infirmier qui vous fait un soin.

Infection


Quels sont les signes qui doivent alerter ?

- 📞 **Des signes autour du PAC :**
Présence de pus, de chaleur, d'une douleur ou d'une rougeur.

- 📞 **Des signes généraux :**
Fièvre, frissons.

Que faire ?

- 📞 **NE TARDER PAS !**
- 📞 **Prévenir le médecin hospitalier qui s'occupe de vous sans tarder, ou aller aux urgences.**



Vous êtes acteur de votre prise en charge

Votre implication peut aider à prévenir l'apparition de complications ou à y remédier le plus vite possible.

**Je vois du pus
autour du PAC**



La cicatrice s'ouvre, est rouge ou gonflée

J'ai de la fièvre, des frissons



**J'appelle le médecin hospitalier
qui s'occupe de moi,
sinon je vais aux urgences.**



Pour plus d'informations

Visitez le site internet :

www.chr-metz-thionville.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux :

@chrmetzthionville





Service UMAC

Unité Médicale Ambulatoire de Chimiothérapie

Hôpital Mercy

1, allée du Château
57245 Ars-Laquenexy

Accueil téléphone:
03 87 75 77 91

Hôpital Bel-Air

1-3, rue du Friscaty
57100 Thionville

Secrétariat téléphone:
03 82 55 83 91