

PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT IMMUNODEPRIME
A RISQUE INFECTIEUX INTERMEDIAIRE OU FAIBLE

Chaque mesure qui a fait l'objet d'une recommandation est signalée (Réf. : XXX). Quand aucune recommandation n'a pu être trouvée, la mention AE (accord d'expert) figure entre parenthèse.

Mesures à mettre en œuvre par les professionnels

<p>Hygiène des mains (Réf. : SF2H, 2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Respecter les 5 indications à l'hygiène des mains
<p>Tenue, Equipements de protection individuelle (Réf. : SF2H, 2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Porter systématiquement : <ul style="list-style-type: none"> ○ Une tenue professionnelle propre du jour • Ne pas porter systématiquement et respecter les précautions standard : <ul style="list-style-type: none"> ○ gants : en cas de risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques ○ masque à usage médical : si le professionnel <u>ou</u> le patient présente des symptômes respiratoires <u>et</u> systématiquement en période d'épidémie de grippe ○ tablier plastique : en cas de soins souillants, mouillants ○ lunettes de protection : en cas de risque de projections de sang ou de liquides biologiques • Inutile de porter : <ul style="list-style-type: none"> ○ Une tenue spécifique dédiée au secteur ○ Une coiffe recouvrant tous les cheveux (sauf si indiquée pour le soin, ex : soins sur PAC) ○ Des surchaussures
<p>Gestion de l'environnement et du matériel (Réf. : SF2H, 2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Préférer le matériel à usage unique ou à défaut, individualiser le matériel ré utilisable (réf. : AE) • En cas d'emploi de matériel ré utilisable, assurer une désinfection avant d'entrer dans la chambre au moyen d'un détergent désinfectant (d/D) (réf. : AE) • Gestion de l'environnement du patient : <ul style="list-style-type: none"> ○ réaliser un bionettoyage au minimum quotidien de la chambre au moyen d'un détergent/désinfectant ○ insister sur l'environnement proche du patient et les surfaces fréquemment manipulées
<p>Organisation de la prise en charge (réf. : AE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regrouper les soins • Limiter les flux de personnel dans la chambre • Maintenir les fenêtres fermées et limiter le temps d'ouverture des portes
<p>Alimentation (Réf. : SF2H, 2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proposer une alimentation à faible risque : <ul style="list-style-type: none"> ○ exclusion de certains aliments (cf. liste SF2H) ○ laver soigneusement les fruits et les légumes crus avant toute consommation (y compris s'ils sont ensuite pelés) ○ cuire les viandes et poissons à cœur (volaille > 180°C, autres viandes et poissons > 160°C), cuire les œufs (attention aux préparations contenant des œufs crus (mousses...)) ○ ne pas consommer de produits laitiers au lait cru → consommer les produits issus de lait pasteurisé ou micro-filtré • Il n'est pas recommandé de proposer de l'eau embouteillée • Assurer un traitement de la vaisselle au lave-vaisselle avec température de lavage > à 60°C (réf. : AE)

PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT IMMUNODEPRIME
A RISQUE INFECTIEUX INTERMEDIAIRE OU FAIBLE

Mesures ciblant les patients

Chambre individuelle (Réf. : SF2H, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Placer le patient en chambre seule obligatoirement
Education du patient (Réf. : AE)	<ul style="list-style-type: none"> • Réaliser une éducation à l'hygiène des mains lors de l'admission type « communication soignant / soigné » (Réf. : SF2H, mars 2018) • Mettre à disposition des patients alités des flacons de produit hydro alcoolique • Informer le patient sur la nature des mesures mises en œuvre et les modalités de respect de ces mesures
Déplacement du patient (Réf. : SF2H, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Limiter les déplacements hors de la chambre • En période d'épidémie de grippe, porter un masque à usage médical hors de la chambre
Linge (réf. : AE)	<ul style="list-style-type: none"> • Changer quotidiennement le linge de corps
Effets personnels (Réf. : SF2H, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de restriction à condition qu'ils soient préalablement nettoyés avec un détergent-désinfectant

Mesures à mettre en œuvre par tous les visiteurs

Généralités (réf. : AE)	<ul style="list-style-type: none"> • Différer sa visite en cas de signes d'infections (toux, rhinorrhée ...) • Limiter les entrées et sorties de la chambre pour réduire le nombre d'ouverture des portes • Limiter les visites
Hygiène des mains (réf. : AE)	<ul style="list-style-type: none"> • Proposer une éducation à l'hygiène des mains lors de la première visite • Réaliser une hygiène des mains à l'entrée dans la chambre du patient • Avant tout contact avec le patient, réaliser une hygiène des mains
Tenue, Equipements de protection individuelle (Réf. : SF2H, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Retirer les bijoux de ses mains, montres et dégager les avant-bras afin de réaliser une FHA optimale (Réf. : AE) • Ne pas porter systématiquement et respecter les précautions standard : <ul style="list-style-type: none"> ○ Masque à usage médical : si le visiteur <u>OU</u> le patient présente des symptômes respiratoires <u>ET</u> systématiquement en période d'épidémie de grippe • Ne porter que dans le cadre de la délivrance des soins, et dans le respect des précautions standard : gants, tablier plastique, lunettes de protection • Inutile de revêtir systématiquement dans la chambre : <ul style="list-style-type: none"> ○ Une coiffe recouvrant tous les cheveux ○ Des surchaussures