

CRITERES MEDICAUX ?

1 critère = HAD envisageable

- Soins palliatifs
- Traitement antalgique = IV, SS Cut
- Traitements intraveineux = AB, autres
- Nutrition : IV, GEP, SNG

- Administration de chimiothérapie (IV, SS Cut, P.O.)
- Surveillance de chimiothérapie
- Surveillance de radiothérapie
- Surveillance d'aplasie

- Pansements complexes
- Thérapie à pression négative
- Stomie compliquée
- Surveillance après intervention chirurgicale

- Rééducation orthopédique (5x/semaine)
- Rééducation neurologique (5x/semaine)

Plusieurs critères = HAD envisageable

- Oxygénothérapie ou VNI
- Suivi psychologique ou social
- Soins de nursing
- Rééducation orthopédique (3x/semaine)
- Rééducation neurologique (3x/semaine)

**Hospitalisation A Domicile
de l'Agglomération Nancéienne**

Tél. : 03 83 44 43 42

Fax : 03 83 28 48 79

www.hadan.fr

« Réserve à l'usage des soignants »

**CRITERES D'INCLUSION DES PATIENTES
EN HAD OBSTETRIQUE ANTE NATALE**
Un critère coché = entrée en HAD envisageable

1 critère = entrée en HAD envisageable	Rupture P rématuration des M embranes
	Fissure P rématuration des M embranes
	HTA pré existante à la grossesse
	HTA gravidique
	Restriction de C roissance I ntra U térine
	Atcd de M ort F œtale I n U téro
	M enace d' A ccouchement P rématuration
	Cholestase gravidique
	Placenta praevia
	Lupus
	Syndrome des anti-phospholipides
	Pathologie psychiatrique
Critères plurifactoriels	Thrombophilie génétique associée à :
	* Un atcd notable: HRP, MFIU
	* Une complication en cours (RCIU)
	Diabète en cours d'être équilibré :
	* Objectifs glycémiques non atteints prise en charge en étroite collaboration avec le diabétologue
* Retentissement sur la grossesse :	
Macrosomie, hydramnios	



Un seul numéro pour nous contacter 7j/7 et 24h/24 :
06-28-59-77-10

DV1/PC/PEC/04 Version 2 du 31/10/2014



**CRITERES D'INCLUSION DES PATIENTES
EN HAD OBSTETRIQUE POST NATALE**
Un critère coché = entrée en HAD envisageable

Soins post césarienne	Difficultés de cicatrisation
	Difficultés d'allaitement
Surveillance et soins de plaie périnéale	A risque
	Complicquée
Pathologies : vasculaires, thrombo emboliques, endocriniennes et infectieuses	HTA
	Anémie sévère (Hb entre 7 et 9 g/dl)
	Phlébite ou embolie en cours de traitement
	Infection traitement en cours
	DID mal équilibré
Risque psychosocial	Baby blues en cours
	Antécédents de dépression
	Mère en situation de vulnérabilité
Difficultés à l'allaitement maternel	